

ปราบยุงลายให้สิ้นซาก ไม่ยุ่งยากด้วย 5 ป 1 ข

ป.ที่ 1 ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำให้สนิท คว้า
กะลา ครอบง เศษภาชนะที่ไม่ใช้ เก็บวาง
รถยนต์




ป.ที่ 2 เปลี่ยนน้ำในภาชนะทุกสัปดาห์



ป.ที่ 3 ปล่อยปลา กินลูกน้ำ



ป.ที่ 4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้านให้โปร่ง โล่ง
กำจัดและฝังกลบขยะไม่เป็นที่อาศัยของยุงลาย



ป.ที่ 5 ปฏิบัติเป็นประจำจนเป็นนิสัย



ข.ที่ 1 ชัดไข่ โดย ชัดภาชนะให้สะอาด เพื่อ
กำจัดไข่ยุงลายที่เกาะตามขอบภาชนะต่างๆ



เก็บ 3 เก็บ

เก็บที่ 1 เก็บขยะ เศษภาชนะขังน้ำแหล่งเพาะ
พันธุ์ยุงลาย วัสดุที่เหลือใช้นำไปขายเป็นรายได้
เสริม

เก็บที่ 2 เก็บบ้าน ให้ปลอดโปร่งยุงลายไม่เกาะ
พัก ชัดล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ เปลี่ยนน้ำในแจกัน
ทุกสัปดาห์

เก็บที่ 3 เก็บน้ำ น้ำกินน้ำใช้เก็บให้มิดชิด โดย
การเปิดฝาโอ่ง ถัง ไม้ให้ยุงลายลงไปวางไข่

การป้องกันโรคไข้เลือดออก

ป้องกันไม่ให้ยุงลายกัด โดยสวมใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดมิดชิด ใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ เช่น DEET รวมถึงป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้ามาหลบซ่อนในบ้าน ทั้งนี้ ยุงลายมักกัดในเวลากลางวันมากกว่ากลางคืน

ในรายที่อายุมากกว่า 9 ปี และน้อยกว่า 45 ปี ร่วมกับมีประวัติ เคยเป็นไข้เลือดออกมาแล้ว อาจพิจารณาฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกจากสายพันธุ์อื่น

ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บริเวณบ้านและใกล้เคียง ด้วยการปิดฝาภาชนะที่มีน้ำขังไม่ให้ยุงเข้าไปวางไข่ได้ เปลี่ยนน้ำในภาชนะที่ปิดไม่ได้ เช่น แจกัน ทุกสัปดาห์ ปล่อยปลาในลูกน้ำในอ่างบัว ปรับปรุงสภาพแวดล้อม บริเวณบ้านให้สะอาดปราศจากเศษวัสดุที่อาจมีน้ำขังได้ เช่น ขวดเก่า กระป๋องเก่า เป็นต้น

เด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี
เป็นไข้เลือดออก
เฉลี่ย 3 คน / ชั่วโมง



บ้านเมืองปลอดภัย ห่างไกลโรคไข้เลือดออก



องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอภินทรบุรี จังหวัดปราจีนบุรี
โทร. ๐๓๗-๒๑๐๓๐๔